



COMUNE DI MONTE SAN SAVINO
(Provincia di Arezzo)

STOP ALLE ZANZARE




Tel. 0575 741500



PREVIENI LA DIFFUSIONE

RICORDA QUESTI SEMPLICI CONSIGLI



elimina i sottovasi e dove non è possibile evita il ristagno d'acqua al loro interno



pulisci accuratamente i tombini e coprili con una rete zanzariera evitando che si intasi dopo le piogge



rimuovi sempre gli sfalci d'erba e tieni il giardino pulito



non lasciare gli innaffiatoi e i secchi con l'apertura rivolta verso l'alto



controlla periodicamente le grondaie mantenendole pulite e non ostruite



tieni pulite fontane e vasche ornamentali, eventualmente introduci pesci rossi che sono predatori delle larve di zanzara tigre



svuota settimanalmente e tieni pulite le ciotole per l'acqua degli animali domestici



non lasciare le piscine gonfiabili e altri giochi in giardino pieni d'acqua



copri le cisterne e tutti i contenitori dove si raccoglie l'acqua piovana



nei cimiteri pulisci periodicamente e con cura i vasi portafiori, cambia di frequente l'acqua dei vasi o trattala con prodotti larvicidi

Trattare regolarmente con compresse antilarvali tutti quei siti dove non è possibile eliminare i ristagni d'acqua.

Nella lotta contro le zanzare, simuliidi e chironomidi è sufficiente distribuire le compresse nelle zone dove risiedono le larve, ovvero acque stagnanti come tombini, fontane, copertoni, fosse biologiche, pozzetti, bocche di lupo, depuratori, vasche di depurazione, piccoli specchi d'acqua, fossi, stagni, canali ed in generale dove vi sono accumuli d'acqua.

Modalità d'uso


A seconda della carica organica delle acque, le dosi consigliate sono:

- per le acque chiare: 1 compressa da g 2 ogni 1.000/2.000 litri
- per acque a forte carica di materiale organico: 1 compressa da g 2 ogni 500/1.000 litri
- per ambienti confinati con forte carica organica, come i tombini: 1 compressa da g 2 per 40 litri


Trattare regolarmente da marzo a ottobre i possibili luoghi dove possono essere presenti le larve. Ripetere il trattamento ogni 2-4 settimane a seconda delle temperature e della pulizia dell'acqua e in caso di piogge persistenti.



Mezza pastiglia o frazione nei sottovasi



Pastiglia intera nei tombini/pozzetti



Pastiglia intera nei fossi/canali